**Всероссийская студенческая физико-математическая олимпиада
имени Георгия Николаевича Шуппе
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина
7-9 апреля 2023 года**

Задача 1. Вычислите предел $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} / a_n)$, где a_n – определитель матрицы n -го порядка, в которой $a_{ij} = 1$, если $i = j$ или $i = j - 1$, $a_{ij} = -1$, если $i = j + 1$, $a_{ij} = 0$, если $|i - j| \geq 2$.

Решение.

$$a_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \end{vmatrix}_{n \times n} \quad . \text{ Разложим по первой строке.}$$

$$a_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \end{vmatrix}_{(n-2) \times (n-2)} = a_{n-1} + a_{n-2}.$$

При этом $a_1 = 1$, $a_2 = 2$. Таким образом, последовательность a_n представляет собой последовательность Фибоначчи, смещенную на один элемент влево. $a_n = F_{n+1}$. Последовательность Фибоначчи является линейной рекуррентной последовательностью с характеристическим уравнением $x^2 - x - 1 = 0$, корнями

которого являются числа $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ и $1 - \varphi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$. Тогда $F_n = \frac{\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$, то есть

$$a_n = \frac{\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\sqrt{5}}. \text{ Тогда } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^{n+2} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^{n+2}}{\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi.$$

Задача 2. Доказать, что координаты (x, y) всех точек линии $x^2 + y^2 + 2y - 7 = 0$ удовлетворяют

неравенству: $\begin{vmatrix} x & y+1 & 1 \\ 1 & x & y+1 \\ y+1 & 1 & x \end{vmatrix} \leq 27$. При каком условии достигается равенство?

Решение.

Заданная линия – окружность: $x^2 + (y+1)^2 = 8$.

Определим векторы:

$$\mathbf{a} = (x, y+1, 1), \mathbf{b} = (1, x, y+1), \mathbf{c} = (y+1, 1, x).$$

$$\text{Тогда } \begin{vmatrix} x & y+1 & 1 \\ 1 & x & y+1 \\ y+1 & 1 & x \end{vmatrix} = \mathbf{abc} \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}||\mathbf{c}| = \left(\sqrt{x^2 + (y+1)^2 + 1}\right)^3 = 9^{\frac{3}{2}} = 27.$$

Равенство достигается, если $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \perp \mathbf{c}$, то есть если $x + x(y+1) + (y+1) = 0$. Откуда, $x = -\frac{y+1}{y+2}$.

Задача 3. Пусть $f_n(x) = \frac{(x+2)^2(x+4)^3 \dots (x+2^n)^{n+1}}{(x+3)^2(x+9)^3 \dots (x+3^n)^{n+1}}$, для любого $n \in \mathbb{N}$. Найти (в явном виде) такую

функцию $g(n)$, при которой существует конечный, ненулевой предел $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f'_n(0) \cdot g(n))$.

Решение.

Применяя формулу логарифмической производной, получим

$$f'_n(x) = f_n(x) \left(\frac{2}{x+2} + \frac{3}{x+4} + \dots + \frac{n+1}{x+2^n} - \frac{2}{x+3} - \frac{3}{x+9} - \dots - \frac{n+1}{x+3^n} \right).$$

Тогда

$$\begin{aligned} f'_n(0) &= \left(\frac{2}{3}\right)^{\sum_{k=1}^n k(k+1)} \left(\frac{2}{2} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{n+1}{2^n} - \frac{2}{3} - \frac{3}{9} - \dots - \frac{n+1}{3^n} \right) = \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{n(n+1)(n+2)}{3}} \left(\frac{2}{2} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{n+1}{2^n} - \frac{2}{3} - \frac{3}{9} - \dots - \frac{n+1}{3^n} \right) \end{aligned}$$

Теперь, положим $g(n) = \left(\frac{2}{3}\right)^{-\frac{n(n+1)(n+2)}{3}}$. Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} (f'_n(0) \cdot g(n)) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{2} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{n+1}{2^n} - \frac{2}{3} - \frac{3}{9} - \dots - \frac{n+1}{3^n} \right) = \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{2} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{n+1}{2^n} \right) - \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3} + \frac{3}{9} + \dots + \frac{n+1}{3^n} \right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{m+1}{3^m} = \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

Ответ: $g(n) = \left(\frac{2}{3}\right)^{-\frac{n(n+1)(n+2)}{3}}$.

Задача 4. Вычислите интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 \exp(2 \operatorname{arctg} x)}{(1+x^2)^3} dx$.

Решение.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 \exp(2 \operatorname{arctg} x)}{(1+x^2)^3} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^2 \exp(2 \operatorname{arctg} x)}{(1+x^2)^3} dx + \int_{-\infty}^0 \frac{x^2 \exp(2 \operatorname{arctg} x)}{(1+x^2)^3} dx.$$

Сделаем во втором интеграле замену $t = -x$.

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x^2 \exp(2 \operatorname{arctg} x)}{(1+x^2)^3} dx + \int_{+\infty}^0 \frac{t^2 \exp(-2 \operatorname{arctg} t)}{(1+t^2)^3} (-dt) &= \int_0^{+\infty} \frac{x^2 \exp(2 \operatorname{arctg} x)}{(1+x^2)^3} dx + \int_0^{+\infty} \frac{x^2 \exp(-2 \operatorname{arctg} x)}{(1+x^2)^3} dx = \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^2} (\exp(-2 \operatorname{arctg} x) + \exp(2 \operatorname{arctg} x)) \frac{dx}{1+x^2} = I \end{aligned}$$

Сделаем замену $t = 2 \operatorname{arctg} x$.

$$I = \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 t}{4} (\exp(-t) + \exp(t)) \frac{dt}{2} = \frac{1}{8} \int_0^{\pi} \sin^2 t (\exp(-t) + \exp(t)) dt.$$

Вычисление последнего интеграла не вызывает трудностей.

$$I = \frac{1}{8} \int_0^{\pi} (1 - \cos 2t) \operatorname{ch} t dt = \frac{1}{8} \int_0^{\pi} (\operatorname{ch} t - \cos 2t \operatorname{ch} t) dt = \frac{1}{8} \operatorname{sh} t \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{8} \int_0^{\pi} \cos 2t \operatorname{ch} t dt = \frac{\operatorname{sh} \pi}{8} - \frac{J}{8}$$

$$J = \int_0^{\pi} \cos 2t \operatorname{ch} t dt = \operatorname{sh} t \cos 2t \Big|_0^{\pi} + 2 \int_0^{\pi} \sin 2t \operatorname{sh} t dt = \operatorname{sh} \pi + 2 \left(\sin 2t \operatorname{ch} t \Big|_0^{\pi} - 2 \int_0^{\pi} \cos 2t \operatorname{ch} t dt \right)$$

$$J = \operatorname{sh} \pi - 4J, \text{ откуда } J = \frac{\operatorname{sh} \pi}{5}. \text{ Тогда } I = \frac{\operatorname{sh} \pi}{8} - \frac{\operatorname{sh} \pi}{8 \cdot 5} = \frac{\operatorname{sh} \pi}{10}.$$

Задача 5. Наудачу на плоскость бросают идеальный тетраэдр, стороны которого окрашены в белый, красный, синий цвета, четвертая сторона – бело-сине-красная. Пусть событие A – «На нижней грани есть белый цвет», событие B – «На нижней грани есть красный цвет», событие C – «На нижней грани есть синий цвет». Проверить попарную и совокупную независимости этих событий.

Решение.

Очевидно, $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$. Так как $P(AB) = P(BC) = P(AC) = \frac{1}{4}$, то $P(AB) = P(A)P(B)$,

$P(BC) = P(B)P(C)$, $P(AC) = P(A)P(C)$, то события A, B, C – попарно независимы.

Так как $P(ABC) = \frac{1}{4} \neq P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}$, то события A, B, C – зависимы в совокупности.

Задача 6. Найти линейное однородное уравнение $p_0(x)y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$, где $p_i(x) \neq 0$, имеющее частные решения: $y_1(x) = x$, $y_2(x) = 1/x$. Сделать проверку.

Решение.

Так как всякое решение $y(x)$ искомого дифференциального уравнения должно быть линейно зависимым от решений $y_1(x)$ и $y_2(x)$, то определитель Вронского:

$$\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & y(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & y'(x) \\ y_1''(x) & y_2''(x) & y''(x) \end{vmatrix} = 0.$$

Откуда, раскладывая определитель по третьему столбцу, получаем:

$$y''(x) \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} - y'(x) \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1''(x) & y_2''(x) \end{vmatrix} + y \begin{vmatrix} y_1'(x) & y_2'(x) \\ y_1''(x) & y_2''(x) \end{vmatrix} = 0.$$

Подставляя, получим:

$$y''(x) \begin{vmatrix} x & 1/x \\ 1 & -1/x^2 \end{vmatrix} - y'(x) \begin{vmatrix} x & 1/x \\ 0 & 2/x^3 \end{vmatrix} + y \begin{vmatrix} 1 & -1/x^2 \\ 0 & 2/x^3 \end{vmatrix} = 0.$$

Откуда получаем: $y''(x) \left(-\frac{2}{x} \right) - y'(x) \left(\frac{2}{x^2} \right) + y \left(\frac{2}{x^3} \right) = 0$.

Окончательно, искомое уравнение: $x^2 y''(x) + xy'(x) - y = 0$.

Задача 7. Разложите в ряд Тейлора: А) функцию $f(x) = \exp(-x^2)$, где $x \in \mathbb{R}$ в окрестности точки $x = 0$, Б) функцию $f(z) = \exp(-z^{-2})$, где $z \in \mathbb{C}$ в окрестности точки $z = 0$.

Решение.

А) Доопределим $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ до непрерывности в точке $x = 0$. Это допустимо, поскольку $x = 0$ точка разрыва 1-го рода, и разрыв устранимый. Таким образом,

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

Тогда: $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = 0$. Аналогично, $f^{(n)}(0) = 0$. То есть, ряд Маклорена для $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \equiv 0$.

Этот результат не противоречит теореме о единственности разложения функции в ряд Тейлора, т.е. если $f(x)$ бесконечно дифференцируема в точке $x = x_0$, и если функция представима в виде степенного ряда $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, то этот ряд будет обязательно рядом Тейлора. Обратное неверно: если заранее не предположить сходимость, а просто считать функцию бесконечно дифференцируемой и составить для неё ряд Тейлора, то ниоткуда не следует, что этот ряд будет сходиться при значениях $x \neq x_0$.

Б) Пусть $z = x + iy \in \mathbb{C}$. По теореме Тейлора, функция $f(z)$, аналитическая внутри круга $|z - z_0| < R$, может быть представлена в этом круге сходящимся степенным рядом $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$, причем этот ряд определен однозначно.

Покажем, что функция $f(z) = e^{-\frac{1}{z^2}}$ не является аналитической в окрестности точки $z = 0$.

$f(z) = e^{-\frac{1}{z^2}} = e^{-\frac{1}{(x+iy)^2}}$. Очевидно, что $f(z)$ разрывна в $z = 0$, так как $\lim_{x \rightarrow 0} f(z) = 0$, $\lim_{y \rightarrow 0} f(z) = \infty$

Таким образом, $f(z) = e^{-\frac{1}{z^2}}$ не является аналитической в окрестности точки $z = 0$, и в ряд Тейлора разложена быть не может.

Задача 8. Выразить тройную сумму $\sum_{i, j, k \geq 0, i+j+k \leq n} 2^k$ без использования знака суммы.

Решение.

Распишем тройную сумму и преобразуем ее, используя новые переменные $l = n - i - j$ и $m = n - i$:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i, j, k \geq 0, i+j+k \leq n} 2^k = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n-i} \sum_{k=0}^{n-i-j} 2^k = \sum_{m=0}^n \sum_{l=0}^m \sum_{k=0}^l 2^k = \sum_{m=0}^n \sum_{l=0}^m (2^{l+1} - 1) = \sum_{m=0}^n \left(2 \sum_{l=0}^m 2^l - (m+1) \right) = \\ &= \sum_{m=0}^n (2(2^{m+1} - 1) - (m+1)) = 4 \sum_{m=0}^n 2^m - \sum_{m=0}^n (m+3) = 4(2^{n+1} - 1) - \frac{(n+1)(n+6)}{2} = 2^{n+3} - \frac{n^2 + 7n + 14}{2}. \end{aligned}$$

Задача 9. Пользуясь теоремой Остроградского – Гаусса, вычислить интеграл $\mathbf{I} = \oiint_{(S)} \mathbf{r}(\mathbf{A}, \mathbf{n}) d\sigma$, если

объем, который охватывает поверхность (S) равен V , $\mathbf{A}$ – постоянный вектор, $\mathbf{r}$ – радиус-вектор, $\mathbf{n}$ – вектор нормали (внешний) к поверхности (S) .

Решение.

Скалярно умножим обе части равенства на некоторый произвольный постоянный вектор $\mathbf{p}$ и, используя теорему Остроградского – Гаусса, получим:

$$(\mathbf{p}, \mathbf{I}) = \left(\mathbf{p}, \oiint_{(S)} \mathbf{r}(\mathbf{A}, \mathbf{n}) d\sigma \right) = \oiint_{(S)} (\mathbf{p}, \mathbf{r})(\mathbf{A}, \mathbf{n}) d\sigma = \iiint_{(V)} \operatorname{div}((\mathbf{p}, \mathbf{r})\mathbf{A}) dV.$$

Так как $\operatorname{div}((\mathbf{p}, \mathbf{r})\mathbf{A}) = (\mathbf{p}, \mathbf{r}) \operatorname{div} \mathbf{A} + (\mathbf{A}, \operatorname{grad}(\mathbf{p}, \mathbf{r})) = (\mathbf{A}, \operatorname{grad}(\mathbf{p}, \mathbf{r})) = (\mathbf{A}, \mathbf{p})$.

Последняя строчка требует обоснования.

Тогда, $(\mathbf{p}, \mathbf{I}) = \iiint_{(V)} (\mathbf{A}, \mathbf{p}) dV = (\mathbf{A}, \mathbf{p})V$.

Так как $\mathbf{p}$ – произвольный постоянный вектор, то $\mathbf{I} = \mathbf{A}V$.

Задача 10. Назовем коммутатором операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$ оператор $\hat{K} = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$. Найти коммутаторы операторов: А) x и $\frac{d}{dx}$; Б) $i\hbar\nabla$ и $\mathbf{A}(\mathbf{r})$, где ∇ - оператор набла, $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ некоторая вектор-функция, $\hbar$ - постоянная Планка.

Решение

А) Действуя оператором $\frac{d}{dx}x - x\frac{d}{dx}$ на некоторую произвольную функцию, получим

$$\left(\frac{d}{dx}x - x\frac{d}{dx}\right)\psi = \frac{d}{dx}(x\psi) - x\frac{d\psi}{dx} = \psi$$

То есть $\frac{d}{dx}x - x\frac{d}{dx} = 1$.

Б) Аналогично, $(i\hbar\nabla\mathbf{A}(\mathbf{r}) - \mathbf{A}(\mathbf{r})i\hbar\nabla)\psi = i\hbar(\nabla\mathbf{A}(\mathbf{r}) - \mathbf{A}(\mathbf{r})\nabla)\psi = i\hbar(\text{div } \mathbf{A}(\mathbf{r}))\psi$.

То есть, $i\hbar\nabla\mathbf{A}(\mathbf{r}) - \mathbf{A}(\mathbf{r})i\hbar\nabla = i\hbar \text{div } \mathbf{A}(\mathbf{r})$.

Задача 11. Бруску массой m , прикрепленному невесомой недеформированной пружинной с коэффициентом упругости k к вертикальной стене сообщили скорость v_0 в направлении стены. Брусок не сталкивается со стеной, движется вдоль одной прямой по горизонтальному шероховатому столу. Коэффициент трения скольжения бруска о стол равен μ . Определите время движения бруска до остановки.

Решение.

Постоянная сила (в данном случае сила трения скольжения) не изменяет характера колебаний, совершаемых телом под действием квазиупругой силы, а только смещает центр этих колебаний.

Выберем начало СК в точке равновесия ($F_{\text{упр.}} = F_{\text{мп.}}$, $kx_0 = \mu mg$). Рассмотрим движение тела до первой точки поворота (или до остановки):

$$x = x_{m1} \sin(\omega t + \phi), \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} \quad t_1 = \frac{1}{\omega} \left(\frac{\pi}{2} - \phi \right) = \frac{1}{\omega} \left(\frac{\pi}{2} - \text{arctg} \left(\frac{\omega x_0}{v_0} \right) \right) = \frac{1}{\omega} \left(\frac{\pi}{2} - \text{arctg} \left(\frac{1}{\omega \tau} \right) \right)$$

$$v = \omega x_{m1} \cos(\omega t + \phi)$$

В момент $t = 0$, $x = x_0$, $v = v_0$.

$$x_0 = x_{m1} \sin(\phi), \quad v = \omega x_{m1} \cos(\phi)$$

$$\phi = \text{arctg}(\omega x_0 / v_0), \quad x_{m1} = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

При движении до первой точки поворота (или до остановки) путь $S_1 = x_{m1} - x_0$, $v = 0$, $\omega t_1 + \phi = \frac{\pi}{2}$, отсюда

$$\text{, где } \tau = \frac{v_0}{\mu g}$$

Если хватает энергии пружины, тело продолжит движение в противоположном направлении и будет совершать колебания с частотой ω после каждого полупериода амплитуда колебаний уменьшается на $2x_0$.

Число таких полупериодов $n = \left[\frac{x_{m1}}{2x_0} \right]$. Обозначено $[z]$ - целая часть числа z .

$$\text{Тогда общее время движения } t_{\text{об}} = t_1 + n \frac{T}{2} = \frac{1}{\omega} \left(\frac{\pi}{2} - \text{arctg} \left(\frac{1}{\omega \tau} \right) + \pi \left[\frac{1}{2} \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2} \right] \right)$$

$$\text{Ответ: } t_{\text{об}} = \frac{1}{\omega} \left(\frac{\pi}{2} - \text{arctg} \left(\frac{1}{\omega \tau} \right) + \pi \left[\frac{1}{2} \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2} \right] \right), \quad \tau = \frac{v_0}{\mu g}, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Задача 12. Две тонкие плосковыпуклые линзы, будучи сложены плоскими сторонами, образуют линзу с фокусным расстоянием F_1 . Найдите фокусное расстояние F_2 линзы, которая получится, если сложить

эти линзы выпуклыми сторонами, а пространство между ними заполнить водой. Показатель преломления стекла $n_c = 1,66$, воды - $n_g = 1,33$. Оптические оси линз в обоих случаях совпадают.

Решение.

Пусть R_1 радиус кривизны первой линзы, R_2 - второй. Тогда, при сложении этих линз плоскими сторонами, получим линзу с оптической силой

$$\frac{1}{F_1} = (n_c - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Если приложить линзы друг к другу выпуклыми сторонами, а пространство между ними зальем водой, то это эквивалентно тому, что будет сложено вплотную три линзы: первые две и одна отрицательная. Оптическая сила такой системы

$$\begin{aligned} \frac{1}{F_2} &= (n_c - 1) \frac{1}{R_1} - (n_g - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + (n_c - 1) \frac{1}{R_2} = \\ &= \frac{1}{F_1} - (n_g - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{F_1} - \frac{(n_g - 1)(n_c - 1)}{(n_c - 1)} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \\ &= \frac{1}{F_1} \left(1 - \frac{(n_g - 1)}{(n_c - 1)} \right) = \frac{1}{F_1} \left(1 - \frac{0,33}{0,66} \right) = \frac{1}{2F_1}. \end{aligned}$$

Таким образом, $F_2 = 2F_1$.

Задача 13. В невесомости положительно заряженная пылинка движется по круговой орбите вокруг отрицательно заряженного массивного шара. Во сколько раз увеличится период обращения пылинки, если шар мгновенно потеряет 40% заряда?

Решение.

Примем радиус старой орбиты за 1. Новая орбита – эллипс с полуосями $b > a$. Точка B , в которой пылинка перейдет на новую орбиту, является вершиной большой полуоси. В этой точке обе орбиты имеют общую касательную, кривизна старой орбиты равна 1, кривизна новой орбиты равна 0,6 (при одинаковой скорости кривизна пропорциональна нормальному ускорению, которое уменьшилось на 40%).

Введем декартову систему координат, в которой новая орбита $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, т.е. в окрестности точки $B(0, b)$ имеем $y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$.

Кривизна в точке B равна

$$\begin{aligned} 0,6 &= \frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{3/2}} = -y'' = -\left(\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}\right)'' = \frac{b}{a} \left(\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}\right)' = \frac{b}{a} \frac{\sqrt{a^2 - x^2} - x \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2}}}{a^2 - x^2} = \\ &= \frac{b}{a} \frac{(a^2 - x^2) + x^2}{(a^2 - x^2)^{3/2}} = \frac{ab}{(a^2 - x^2)^{3/2}}. \text{ При } x=0 \text{ кривизна равна } 0,6 = \frac{b}{a^2}, \text{ откуда } a^2 = \frac{5}{3}b. \end{aligned}$$

Поскольку расстояние от B до фокуса эллипса (центра притягивающего шара) равно 1, получаем еще одно соотношение между полуосями: $\sqrt{b^2 - a^2} = b - 1$, откуда $b^2 - \frac{5}{3}b = (b - 1)^2$, т.е. $b = 3$, $a = \sqrt{5}$.

Момент скорости пылинки не изменился, следовательно, период обращения возрос во столько же раз, как площадь орбиты: $\frac{\pi ab}{\pi} = ab = \sqrt{5} \cdot 3$.

Ответ: в $3\sqrt{5} \approx 6,71$ раз.