**II тур Всероссийской студенческой олимпиады по математике.
Открытая Олимпиада г. Рязани 26.04.2014 г.**

1 курс.

1. Вычислить определитель n -го порядка:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Решение. Разложить определитель по последней строке, получить сумму двух определителей, один из которых равен Δ_{n-1} , другой определитель разложить по последнему столбцу, после чего решить рекуррентное уравнение $\Delta_n = \Delta_{n-1} - (-1)^n$. Ответ: $\Delta_n = \frac{1 - (-1)^n}{2}$.

2. Даны матрицы: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$. Найти A^n и B^n .

Ответ: $A^n = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, если n - нечетное, $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, если n - четное.

$$B^n = \begin{pmatrix} \cos n\alpha & -\sin n\alpha \\ \sin n\alpha & \cos n\alpha \end{pmatrix}.$$

3. На сторонах AB и AC треугольника ABC взяты соответственно точки M и N так, что $AM:MB=2:3$, $AN:NC=3:5$. В каком отношении делится каждый из отрезков BN и CM точкой K их пересечения?

Решение. Поскольку векторы $\mathbf{AB}$ и $\mathbf{AC}$ неколлинеарные, выберем их в качестве базиса на плоскости. С одной стороны, точка K принадлежит прямой, поэтому существует такое значение t , при котором $\mathbf{AK} = t \cdot \mathbf{AN} + (1-t) \cdot \mathbf{AB}$. С другой стороны, точка K принадлежит прямой CM , поэтому существует такое значение s , при котором $\mathbf{AK} = s \cdot \mathbf{AM} + (1-s) \cdot \mathbf{AC}$. Учитывая, что $\mathbf{AN} = \frac{3}{8} \mathbf{AC}$ и $\mathbf{AM} = \frac{2}{5} \mathbf{AB}$, получаем, что $\mathbf{AK} = t \cdot \frac{3}{8} \mathbf{AC} + (1-t) \cdot \mathbf{AB} = s \cdot \frac{2}{5} \mathbf{AB} + (1-s) \cdot \mathbf{AC}$. В силу единственности разложения вектора $\mathbf{AK}$ по базису на плоскости, приравниваем соответствующие координаты:

$$\begin{cases} \frac{3}{8}t = 1-s, \\ 1-t = \frac{2}{5}s, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3t = 8-8s, \\ 5-5t = 2s, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{12}{17}, \\ s = \frac{25}{34}. \end{cases}$$

Таким образом, $\mathbf{AK} = \frac{12}{17} \mathbf{AN} + \frac{5}{17} \mathbf{AB}$, т. е. точка K делит отрезок BN в отношении

$BK:KN=12:5$. Также получаем, что $\mathbf{AK} = \frac{25}{34} \mathbf{AM} + \frac{9}{34} \mathbf{AC}$, т. е. точка K делит отрезок CM в отношении $CK:KM=25:9$.

4. Доказать, что последовательность $\frac{1}{2}, 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}, \dots$ имеет предел, и найти этот предел.

Решение.

Если предел A существует, то он удовлетворяет отношению $A = 1 + 1/A$, откуда $A = 1 + \sqrt{2}$. Обозначим n -й член рассматриваемой последовательности $1 + \sqrt{2} + \delta_n$. Тогда

$$\delta_{n+1} = \frac{\delta_n (1 - \sqrt{2})}{1 + \sqrt{2} + \delta_n}$$

и при $|\delta_n| < 1$ имеем

$$|\delta_{n+1}| \leq |\delta_n| \left| \frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right| \leq \frac{1}{2} |\delta_n|$$

Но $\delta_1 = 1 - \sqrt{2}$, $|\delta_1| \leq \frac{1}{2}$, так что $|\delta_n| \leq \frac{1}{2^n}$ и $|\delta_n| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ откуда и вытекает, что предел действительно существует и равен $1 + \sqrt{2}$.

5. Вычислить предел функции

$$f(x) = \left(\operatorname{arctg} x - \arccos \frac{1}{x} \right) x^3 \text{ при } x \rightarrow +\infty.$$

Решение. Так как $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\operatorname{arctg} x - \arccos \frac{1}{x} \right) = 0$, то имеем неопределённость $(0 \cdot \infty)$. При $x \rightarrow +\infty$

$$\left(\operatorname{arctg} x - \arccos \frac{1}{x} \right) \sim \operatorname{tg} \left(\operatorname{arctg} x - \arccos \frac{1}{x} \right) = \frac{x - \sqrt{x^2 - 1}}{1 + x\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \frac{1}{x^2 \left(\frac{1}{x^2} + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \right)} \sim \frac{1}{2x^3}.$$

Итак, главной частью функции $\left(\operatorname{arctg} x - \arccos \frac{1}{x} \right)$ является функция $\frac{1}{2x^3}$, а искомый предел равен $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\operatorname{arctg} x - \arccos \frac{1}{x} \right) x^3 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x^3} x^3 = \frac{1}{2}$.

6. Дана функция $f(x) = x^2 \sin^2 3x$. Вычислить производную $f^{(2014)}(x)$.

Решение. $f(x) = x^2 \sin^2 3x = \frac{1}{2} x^2 (1 - \cos 6x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} \cos 6x$. Очевидно, что $\left(\frac{x^2}{2} \right)^{(2014)} = 0$.

Производная n -го порядка функции $-\frac{x^2}{2} \cos 6x$ определяется по формуле

$-\frac{1}{2} \sum_{k=0}^n C_n^k (x^2)^{(k)} (\cos 6x)^{(n-k)}$. Так как производные функции x^2 порядка выше 3 равны 0, то

учитываются только первые 3 члена ряда. Тогда

$$f^{(n)}(x) = x^2 (\cos 6x)^{(n)} + n \cdot 2x (\cos 6x)^{(n-1)} + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 (\cos 6x)^{(n-2)}.$$

Известно, что $(\cos 6x)^{(n)} = 6^n \cos \left(6x + \frac{\pi n}{2} \right)$. Тогда

$$f^{(n)}(x) = x^2 \cdot 6^n \cos\left(6x + \frac{\pi n}{2}\right) + n \cdot 2x \cdot 6^{n-1} \cos\left(6x + \frac{\pi(n-1)}{2}\right) + n(n-1)6^{n-2} \cos\left(6x + \frac{\pi(n-2)}{2}\right).$$

Для $f^{(2014)}(x)$ получим:

$$f^{(2014)}(x) = x^2 \cdot 6^{2014} \cos(6x + 1007\pi) + 2014 \cdot 2x \cdot 6^{2013} \cos\left(6x + 1006\pi + \frac{\pi}{2}\right) + 2014 \cdot 2013 \cdot 6^{2012} \cos(6x + 1006\pi) = -x^2 \cdot 6^{2014} \cos 6x - 4028x \cdot 6^{2013} \sin 6x + 2014 \cdot 2013 \cdot 6^{2012} \cos(6x).$$

7. Пусть $0 < a < b$. Докажите, что

$$\int_a^b (x^2 + 1)e^{-x^2} dx \geq e^{-a^2} - e^{-b^2}.$$

Решение. Пусть $f(x) = \int_0^x (t^2 + 1)e^{-t^2} dt$ и $g(x) = -e^{-x^2}$; обе функции - возрастающие. Тогда, по

теореме Лагранжа, существует $x \in (a, b)$, такой что

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{(x^2 + 1)e^{-x^2}}{2xe^{-x^2}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{x}\right) \geq \sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 1.$$

Поэтому

$$\int_a^b (x^2 + 1)e^{-x^2} dx = f(b) - f(a) \geq g(b) - g(a) = e^{-a^2} - e^{-b^2}.$$

8. Доказать, что $\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$ не зависит от величины α .

Решение. Имеем

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} + \int_1^\infty \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = J_1 + J_2.$$

Сделаем в первом интеграле замену $x = 1/y$, тогда $J_1 = \int_1^\infty \frac{dy}{(1+y^2)(1+y^{-\alpha})}$

откуда получаем, что $J_1 + J_2 = \int_1^\infty \left(\frac{1}{1+x^\alpha} + \frac{x^\alpha}{1+x^\alpha} \right) \frac{dx}{1+x^2} = \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$ не зависит от α .

9. Построить график функции $y(x) = \begin{cases} x(t) = \arccos(\cos t) \\ y(t) = \arcsin(\sin t) \end{cases}$

Решение

1. Область определения $x \in [0; \pi]$, множество значений $y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$;

2. Так как функции $\sin(t), \cos(t)$ - периодические, достаточно рассмотреть изменение параметра в промежутке $t \in [0; 2\pi]$

$$- t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \quad y(x) = \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t \end{cases} \rightarrow x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow y(x) = x;$$

$$\begin{aligned}
 - t \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi \right] & \quad y(x) = \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = \pi - t \end{cases} \rightarrow x \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi \right] \rightarrow y(x) = \pi - x; \\
 - t \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2} \right] & \quad y(x) = \begin{cases} x(t) = 2\pi - t \\ y(t) = \pi - t \end{cases} \rightarrow x \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi \right] \rightarrow y(x) = x - \pi; \\
 - t \in \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi \right] & \quad y(x) = \begin{cases} x(t) = t - 2\pi \\ y(t) = -t + 2\pi \end{cases} \rightarrow x \in \left[0; \frac{\pi}{2} \right] \rightarrow y(x) = -x.
 \end{aligned}$$

10. Заданы координаты вершины пирамиды: $A(1, -2, 1)$, $B(2, -4, 11)$, $C(5, -7, 3)$, $D(2, -4, 1)$.

Требуется:

1. Уравнения плоскостей (ABC) , (BCD) и угол между этими плоскостями;
2. Угол между прямой (AB) и плоскостью (BCD)

Решение

1. Уравнения плоскостей найдем по формуле

$$(ABC) : \begin{vmatrix} x-1 & y+2 & z-1 \\ 1 & -2 & 10 \\ 4 & -5 & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad 46x + 38y + 3z + 27 = 0$$

$$(BCD) : \begin{vmatrix} x-1 & y+4 & z-11 \\ 3 & -3 & -8 \\ 0 & 0 & -10 \end{vmatrix} = 0 \quad x + y + z + 2 = 0$$

Угол между этими плоскостями вычисляем по формуле

$$\varphi = \arccos \frac{46 \cdot 1 + 38 \cdot 1 + 3 \cdot 0}{\sqrt{46^2 + 38^2 + 3^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} \cong 0,107$$

2. Угол между прямой (AB) и плоскостью (BCD) определим по формуле Прямая (AB)

задается уравнением $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{10}$ с направляющим вектором $\mathbf{R} = (1, -2, 10)$. Так как вектор нормали плоскости (BCD) $\mathbf{N} = (1, 1, 0)$, то искомый угол

$$\psi = \arcsin \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 10}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 10^2}} = -0,069.$$